


INYECCIÓN DE TRI-MIX / BI-MIX / QUAD-MIX

Esta es una recomendación general para la administración de Bi-Mix, Tri-Mix o Mix Quad. Todos los pacientes deben revisar las técnicas apropiadas de administración con su médico antes de administrar cualquier terapia inyectable.

Empezando


- Lavarse las manos y mantener el pene limpio.
- Tener algodón con alcohol, la jeringa y botella de solución inyectable lista.
- Limpie el tapón de goma del vial que contiene tri-mezcla con alcohol.
- Retire la tapa de la aguja, la jeringa se llene de aire, tirando hacia atrás del émbolo hasta la dosis deseada.
- Insertar la aguja en el tapón de goma del vial, inyectar el aire, y luego girar el vial boca abajo con la aguja en el interior
- Tire lentamente de nuevo la jeringa para la dosificación requerida..
- Toque en el lado de la jeringa para que las burbujas de aire floten hacia la parte superior e inyectar a cabo las burbujas de aire antes de su uso.
- Retire la aguja del frasco.

Prepare El Sitio



- Ubicación de la inyección es entre la base y la parte intermedia del pene en 9-11 y un-tres. Evitar la línea media, ya que puede dañar la uretra (por donde la orina y el esperma pase) y las arterias del pene y los nervios a las 12 horas. Evitar cualquier venas o arterias visibles en la superficie.
- Tire de la cabeza del pene hacia al lado de la pierna y seleccione un sitio para la inyección.
- Limpie el sitio con alcohol.

Inyección



- Constantemente penetrar en la piel con la aguja a 90°. Empujar la aguja hasta el final.
- Inyectar Trimix durante unos segundos y retirar la aguja.
- Aplicar la compresión en el lugar de la inyección durante 2 minutos. Más tiempo puede ser necesaria para prevenir el sangrado.
- Desechar la aguja y la jeringa en el contenedor adecuado.

Reglas Generales Para La Inyección

- Use la dosis mínima eficaz. Los nuevos aumentos de dosis pueden causar más efectos adversos.
- Las inyecciones deben administrarse en un máximo de tres veces por semana o una vez cada 2 días o según lo especificado por su médico.
- Busque atención médica si la erección dura más de 4 horas.
- La estimulación sexual debe ocurrir después de la inyección.

Las Causas Más Comunes De Respuesta Inadecuada

- La inyección en lugar equivocado.
- La fuga de agente antes de la inyección.
- La eyaculación precoz durante la estimulación.
- Los sentimientos de estrés antes, durante o después de la inyección.
- Dolor localizado durante y después del proceso de inyección.
- Dosis inadecuada.

Dosis Inadecuada Pasos Para Corregir Respuesta Inadecuada

- Revisión técnica de inyección.
- Evaluar momento de la inyección en relación a la estimulación.
- Involucrar a socios e inyectar en un ambiente cómodo.
- Pruebe la terapia de combinación con una menor dosis de PGE-1.
- Volver a evaluar la dosis con su médico y si es aprobado por el médico incremento en 2-3 días o cambio a un agente más potente si en dosis máxima.